

Heeft u last van epilepsie met partiële aanvallen en bent u 18 jaar of ouder? Deze Consultkaart kan u en uw neuroloog helpen om uw mogelijkheden voor het gebruiken van medicijnen te bespreken. Deze Consultkaart gaat alleen over de vijf medicijnen die de meeste voorkeur hebben. Helpen deze medicijnen niet of onvoldoende voor u? Dan kunt u ook andere medicijnen of een ander soort behandeling proberen. Vraag uw neuroloog hiernaar.

MEDICIJNEN →	CARBAMAZEPINE	LAMOTRIGINE	LEVETIRACETAM	OXCARBAZEPINE	VALPROAAT
<b>Hoe en hoe vaak moet ik dit medicijn gebruiken?</b>	In overleg met uw arts neemt u twee tot drie keer per dag een tablet in. U gebruikt de medicijnen zo lang als nodig is.	In overleg met uw arts neemt u één tot twee keer per dag een tablet in. U gebruikt de medicijnen zo lang als nodig is.	In overleg met uw arts neemt u twee keer per dag een tablet in. U gebruikt de medicijnen zo lang als nodig is.	In overleg met uw arts neemt u twee keer per dag een tablet in. U gebruikt de medicijnen zo lang als nodig is.	In overleg met uw arts neemt u één tot twee keer per dag een tablet in. U gebruikt de medicijnen zo lang als nodig is.
<b>Hoe groot is de kans dat ik geen aanvallen meer krijg?</b>	Ongeveer 70 van de 100 (70%) patiënten krijgen geen aanvallen meer.	Ongeveer 70 van de 100 (70%) patiënten krijgen geen aanvallen meer.	Ongeveer 70 van de 100 (70%) patiënten krijgen geen aanvallen meer.	Ongeveer 70 van de 100 (70%) patiënten krijgen geen aanvallen meer.	Ongeveer 70 van de 100 (70%) patiënten krijgen geen aanvallen meer.
<b>Wat zijn veelvoorkomende bijwerkingen?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moeheid</li> <li>- Duizeligheid</li> <li>- Evenwichtsproblemen</li> <li>- Misselijkheid en braken</li> <li>- Uitslag en jeuk</li> <li>- Ongecontroleerd bewegen</li> <li>- Problemen met de bloedstolling</li> <li>- Te weinig zout in het bloed</li> <li>- Botontkalking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemen met slapen</li> <li>- Duizeligheid</li> <li>- Hoofdpijn</li> <li>- Uitslag en jeuk</li> <li>- Een droge mond</li> <li>- Prikkelbaar of geïrriteerd zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moeheid</li> <li>- Duizeligheid</li> <li>- Hoofdpijn</li> <li>- Verkoudheid</li> <li>- Agressief zijn</li> <li>- Depressief, nerveus of angstig voelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moeheid</li> <li>- Duizeligheid</li> <li>- Hoofdpijn</li> <li>- Misselijkheid en braken</li> <li>- Dubbelzien</li> <li>- (Tijdelijke) haaruitval</li> <li>- Verward of vergeetachtig zijn</li> <li>- Vlak, depressief of opgewonden voelen</li> <li>- Te weinig zout in het bloed</li> <li>- Botontkalking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misselijkheid en braken</li> <li>- Aankomen</li> <li>- Onregelmatig ongesteld zijn</li> <li>- (Tijdelijke) haaruitval</li> <li>- Problemen met de bloedstolling</li> <li>- Botontkalking</li> </ul> <p>Als u zwanger bent of wilt worden dan is dit medicijn minder geschikt. Het medicijn is slecht voor de baby.</p>
<b>Kan ik dit medicijn tegelijk gebruiken met andere medicijnen?</b>	Bespreek met uw neuroloog welke medicijnen u gebruikt. Een aantal medicijnen kunt u beter niet tegelijk met carbamazepine gebruiken.	Bespreek met uw neuroloog welke medicijnen u gebruikt. Een aantal medicijnen kunt u beter niet tegelijk met lamotrigine gebruiken.	Bespreek met uw neuroloog welke medicijnen u gebruikt. levetiracetam gaat meestal goed samen met andere medicijnen.	Bespreek met uw neuroloog welke medicijnen u gebruikt. Een aantal medicijnen kunt u beter niet tegelijk met oxcarbazepine gebruiken.	Bespreek met uw neuroloog welke medicijnen u gebruikt. Een aantal medicijnen kunt u beter niet tegelijk met valproaat gebruiken.
<b>Kan ik direct stoppen met dit medicijn?</b>	Nee, u moet langzaam stoppen. Doe dit in overleg met uw arts. Vaak duurt het stoppen twee tot drie maanden.	Nee, u moet langzaam stoppen. Doe dit in overleg met uw arts. Vaak duurt het stoppen twee tot drie maanden.	Nee, u moet langzaam stoppen. Doe dit in overleg met uw arts. Vaak duurt het stoppen twee tot drie maanden.	Nee, u moet langzaam stoppen. Doe dit in overleg met uw arts. Vaak duurt het stoppen twee tot drie maanden.	Nee, u moet langzaam stoppen. Doe dit in overleg met uw arts. Vaak duurt het stoppen twee tot drie maanden.
<b>Mag ik autorijden met dit medicijn?</b> <i>(Let op! voor autorijden met epileptische aanvallen gelden wettelijke regels, zie <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/">http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/</a> paragraaf 7.2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of u mag autorijden, hangt af van uw aanvallen.</li> <li>- De eerste week nadat u gestart bent met carbamazepine mag u niet autorijden.</li> <li>- Is uw dosis hoger dan drie keer per dag 200 mg? Dan mag u het eerste jaar na starten met carbamazepine niet autorijden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of u mag autorijden, hangt af van uw aanvallen.</li> <li>- De eerste week nadat u gestart bent met lamotrigine mag u niet autorijden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of u mag autorijden, hangt af van uw aanvallen.</li> <li>- De eerste week nadat u gestart bent met levetiracetam mag u niet autorijden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of u mag autorijden, hangt af van uw aanvallen.</li> <li>- De eerste week nadat u gestart bent met oxcarbazepine mag u niet autorijden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of u mag autorijden, hangt af van uw aanvallen.</li> <li>- De eerste week nadat u gestart bent met valproaat mag u niet autorijden.</li> </ul>