

## CONSTITUTIONEEL (ATOPISCH) ECZEEM:

### mogelijkheden voor systemische medicijnen bij volwassenen

Heeft u constitutioneel eczeem? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om een keuze te maken uit de mogelijke systemische medicijnen. Een systemisch medicijn is een medicijn dat in het hele lichaam terecht komt. Alle medicijnen remmen de ontstekingsreactie en/of onderdrukken de afweer, zodat uw eczeem minder wordt. Deze medicijnen kunnen mogelijk het risico op infecties en kanker vergroten. U mag tijdens de behandeling met zo'n medicijn niet ingeënt worden met een levend vaccin. Twijfelt u tussen een behandeling met een zalf of crème, een lichtbehandeling en een systemische behandeling? Gebruik dan de Consultkaart "Constitutioneel eczeem: mogelijkheden voor behandeling bij volwassenen".

BEHANDEL- MOGELIJKHEDEN ➔	CICLOSPORINE	AZATHIOPRINE (OFF-LABEL)	METHOTREXAAT (OFF-LABEL)	MYCOFENOLAAT, MYCOFENOLZUUR (OFF-LABEL)	PREDNISON (OFF-LABEL)
<b>Hoe gebruikt u dit medicijn?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U slikt uw pillen 2 keer per dag voor, tijdens of na de maaltijd.</li> <li>- U kunt dit medicijn 1 tot 2 jaar gebruiken. Langer kan soms ook.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U slikt uw pillen 2 keer per dag. Dat doet u 1 uur voor de maaltijd of 3 uur erna.</li> <li>- U kunt dit medicijn 1 jaar gebruiken, sommige mensen gebruiken dit medicijn meerdere jaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eén keer per week slikt u uw pillen of geeft u uzelf een injectie. Dat doet u 1 uur voor de maaltijd of 1,5 tot 2 uur erna.</li> <li>- U kunt dit medicijn langer dan 5 jaar gebruiken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U slikt uw pillen 2 keer per dag, voor, tijdens of na de maaltijd.</li> <li>- Sommige mensen gebruiken dit medicijn meerdere jaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U slikt uw pillen 1 keer per dag voor of tijdens de maaltijd.</li> <li>- Het wordt afgeraden dit medicijn voor langere tijd te gebruiken. In ernstige acute gevallen kunt u Prednison 2 tot 3 weken slikken.</li> </ul>
<b>Wat is het effect op de klachten? En hoe snel verminderen de klachten?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goed effect op de klachten.</li> <li>- Goed effect op de jeuk.</li> <li>- Klachten verminderen binnen 2 tot 6 weken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redelijk effect op de klachten.</li> <li>- Redelijk effect op de jeuk.</li> <li>- Klachten verminderen binnen enkele weken tot enkele maanden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redelijk effect op de klachten.</li> <li>- Redelijk effect op de jeuk.</li> <li>- Klachten verminderen binnen enkele weken tot 10 weken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redelijk effect op de klachten.</li> <li>- Waarschijnlijk een redelijk effect op de jeuk.</li> <li>- Klachten verminderen binnen enkele weken tot enkele maanden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeer goed effect op de klachten.</li> <li>- Zeer goed effect op de jeuk.</li> <li>- Klachten verminderen binnen 1 dag tot enkele dagen.</li> </ul>
<b>Welke bijwerkingen komen heel vaak voor? Dus bij 10 van de 100 patiënten of meer (≥10%).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhoogd bloedvetgehalte (onder andere cholesterol)</li> <li>- Trillingen</li> <li>- Hoofdpijn</li> <li>- Hoge bloeddruk</li> <li>- Overbeharing</li> <li>- Verstoorde nierfunctie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekort aan witte bloedcellen door een verstoorde beenmergfunctie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minder eetlust</li> <li>- Misselijkheid, braken en buikpijn</li> <li>- Slijmvliezen van mond en keel kunnen gaan ontsteken en zweren</li> <li>- Maagklachten en slokdarmklachten</li> <li>- Verstoorde leverfunctie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloedvergiftiging</li> <li>- Tekort aan witte bloedcellen</li> <li>- Tekort aan bloedplaatjes</li> <li>- Bloedarmoede</li> <li>- Misselijkheid, braken, buikpijn en diarree</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er zijn veel 'vaak voorkomende' bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten (1-10%) zoals een verstoorde bloedsuikerspiegel, stemmingswisselingen en vasthouden van vocht.</li> </ul>
<b>Welke aandoeningen kunnen erger worden als u dit medicijn gebruikt?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstoorde nierfunctie</li> <li>- Aandoeningen aan de lever</li> <li>- Hoge bloeddruk</li> <li>- Jicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstoorde leverfunctie</li> <li>- Verstoorde beenmergfunctie</li> <li>- Ontsteking aan de alvleesklier</li> <li>- Jicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aandoeningen aan de lever of nieren</li> <li>- Verstoorde beenmergfunctie</li> <li>- Slechte longfunctie of fibrose (littekens) in de longen</li> <li>- Afweerstoornissen</li> <li>- Maagzweer</li> <li>- Jicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zweer in de maag of twaalfvingerige darm</li> <li>- Suikerziekte</li> <li>- Hoge bloeddruk</li> <li>- Broze botten</li> <li>- Psychische stoornissen</li> </ul>
<b>Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Dan mag u dit medicijn eventueel gebruiken onder strikte controle van een arts.</li> <li>- Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of heeft u een vaderwens? Of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit medicijn niet gebruiken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of heeft u een vaderwens? Of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit medicijn niet gebruiken.</li> <li>- U moet uw alcoholgebruik beperken tot een minimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of heeft u een vaderwens? Of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit medicijn niet gebruiken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Dan mag u dit medicijn eventueel gebruiken onder strikte controle van een arts.</li> <li>- Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft.</li> </ul>